



# kiwi

## MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

**1ª aplicación:** desde inicio de brotación (botón visible) hasta hojas jóvenes visibles (brote de 15 cm).

**Dosis :**

**vía foliar:** 5 L/Ha.

**vía riego:** 8 L/Ha.

**2ª aplicación:** desde brotes de 30 cm hasta botones florales visible.

**Dosis :**

**vía foliar:** 3 L/Ha.

**vía riego:** 5 L/Ha.

**3ª aplicación:** antes de cosecha (45 días aproximadamente).

**Dosis :**

**vía foliar:** 3 L/Ha.

**vía riego:** 5 L/Ha.

## BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Incremento del número de yemas brotadas.
- Asegura una buena estimulación de las brotaciones. Buen equilibrio entre vegetación (superficie foliar) y número de flores, mejor revestimiento del árbol.
- Fortalece los mecanismos de autodefensa del árbol para superar el ataque de *Phytophthora* spp.
- Uniformidad de los frutos y maduración más homogénea.
- Mayor calidad en la piel del fruto, mejora su consistencia.
- Aumenta el tamaño del fruto. Uniformidad de calibres.
- Mejor conservación del fruto.

## RECOMENDACIONES:

Realizar una aplicación de **BIOHIDRAMAR® CUAJE** a partir de inicio de floración hasta pétalos visibles para favorecer el potencial fructífero del cultivo. Con esta aplicación se aumenta la calidad del polen y el número de flores uniformes y fértiles, por lo que obtendremos un mayor cuajado de los frutos.

**Dosis (vía foliar):** 0,1% (1 L/1000L).

Recomendamos realizar varias aplicaciones de **AM•EN®** entre el cuajado y el llenado de frutos (cada 15-21 días aproximadamente) para favorecer el engorde de los mismos. Además, se favorece el agarre de los frutos, se consigue una mayor homogeneidad de los calibres y una mejora en la calidad de los frutos.

**Dosis (vía foliar):** 0,3% (3 L/1000 L).

Se recomienda usar **LANZADERA® CALCIO** para conseguir aumentar la calidad y la vida útil de los frutos.

**Dosis:**

**vía foliar:** 0,3% (3 L/1000 L) o

**vía riego:** 5 L/Ha.

Recomendamos realizar aplicaciones de **LANZADERA® POTASIO** para potenciar la maduración y engorde del fruto.

**Dosis:**

**vía foliar:** 0,25% (2,5 L/1000 L) o

**vía riego:** 5 L/Ha.

A principio de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la aplicación de **CORRIZ•AM®**, con la que conseguiremos:

- Proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular.
- Genera una mejora vegetativa y un mayor diámetro del tronco.
- Ayudará a superar momentos causados por agentes bióticos y abióticos.
- Potencia la multiplicación y la prolongación de las raíces.
- Favorece la micorrización.

**Dosis (vía riego):** 5 - 6 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTO MAX®**