



alcachofa

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: cuando la planta tenga 10 - 15 cms de altura.

Dosis: 2 L/Ha (vía foliar) o 5 L/Ha (vía suelo).

2ª aplicación: cuando comience la brotación del segundo colmo.

Dosis: 3 L/Ha (vía foliar) o 5 L/Ha (vía suelo).

DESINFECCIÓN DE ESQUEJES:

Sumergir los esquejes de alcachofa durante 30 minutos en un depósito que contenga:

- 100 litros de agua.
- 300 ml de **BROTOMAX**®
- 300 ml de **CORRIZ-AM**®

añadidos junto a los fitosanitarios normalmente aplicados.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Buena diferenciación floral unas semanas después de la plantación.
- Equilibrado crecimiento vegetativo, logrando la planta una vegetación abierta.
- Mayor número de flores secundarias: mayor producción.
- Más tamaño en frutos secundarios.
- Brácteas de mayor grosor.
- Frutos más uniformes y de mayor calidad.
- Precocidad: el segundo colmo se adelanta.
- Incremento del sistema de defensa natural: plantas más sanas y resistentes.
- Protección de la clorofila por tener **BROTOMAX**® poder antioxidante.

RECOMENDACIONES:

Para mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios y nutricionales, se recomienda la mezcla con **QUASSAR**® por su alto poder tensioactivo, adherente y penetrante.

Dosis foliar: 1,5 - 3 cc/L