



esparrago

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: cuando comienzan a emerger los rizomas, después de realizar el trasplante de coronas.

Dosis: 6 L/Ha (vía suelo).

2ª aplicación: Ramificación. Cuando se van desarrollando los tallos y hojas.

Dosis: 3 cc/L (vía foliar) o 6 L/Ha (vía suelo).

3ª aplicación: Tras el corte de los turiones.

Dosis: 6 L/Ha (vía suelo).

La primera aplicación hay que realizarla junto con **CORRIZ-AM®** a la dosis de 5 L/Ha (vía riego).

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mayor engrosamiento de coronas y aparición de rizomas.
- Buen equilibrio y desarrollo entre la parte aérea y radicular.
- Evita el decaimiento de la planta.
- Aumenta el contenido de nutrientes y reservas.
- Aumenta el contenido de polifenoles en la planta, incrementando así la capacidad de autodefensa de la misma frente enfermedades vasculares, y su potencial antioxidante.

RECOMENDACIONES:

Para mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios y nutricionales, se recomienda la mezcla con **QUASSAR®** por su alto poder tensioactivo, adherente y penetrante.

Dosis foliar: 1,5 - 3 cc/L.