



arándano

Vaccinium corymbosum – Mirtillo – Blueberry

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

BROTOMAX®, puede ser aplicado durante gran parte del ciclo del cultivo, siendo especialmente recomendable en los siguientes momentos:

- Desarrollo vegetativo. Inicio brotación.
- Aparición de botones florales.
- Preparación y activación tras la poda.
- Momentos de estrés en el cultivo debido a agentes abióticos.

Dosis:

- **Vía foliar:** 0,3% (3 L/1000 L).
- **Vía riego localizado:** 5-6 L/Ha.

Podemos aplicar **BROTOMAX®** cada 21 días a razón de 1,5 L/Ha vía riego, para mantener la sanidad del cultivo.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- Mayor desarrollo vegetativo.
- Aumento del número y longitud de los brotes.
- Mejora del cuajado.
- Aumento de producción y calidad de los frutos.
- Aumento del contenido en polifenoles de la planta y su potencial antioxidante, mejorando su sistema vascular y, por lo tanto, su estado sanitario.

RECOMENDACIONES

A principios de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la aplicación de **CORRIZ-AM®**. Conseguiremos mayor proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular, por lo que obtendremos un mejor establecimiento de las plantas y nos ayudará a superar dichos momentos causados por agentes bióticos y abióticos durante el ciclo del cultivo.

Dosis (vía riego): 5 L/Ha.

Se recomienda realizar aplicaciones de **BIOHIDRAMAR® CREMA** con el objetivo de conseguir un mejor desarrollo del cultivo, una homogeneización de la floración, cuajado y engorde así como superar momentos de estrés.

Dosis: 0,25% (vía foliar) o 2,5 L/Ha (vía riego)

Recomendamos realizar aplicaciones de **LANZADERA® CALCIO** para conseguir aumentar la calidad y la vida útil de los frutos.

Dosis: 0,3% (vía foliar) o 3 L/Ha (vía riego)

Recomendamos realizar aplicaciones de **LANZADERA® POTASIO** para potenciar la maduración y el engorde del fruto.

Dosis: 0,15% (vía foliar) o 1,5 L/Ha (vía riego)


AGROMÉTODOS

 **BROTOMAX®**